AVERTISSEMENTS



Bulletin n° 15 du 8 juin 1994

GRANDES CULTURES

Tournesol - Pucerons: Surveiller.

- Traitement fongicide à la floraison. **Pois**

- Fin des traitements. Blé

- Attention aux noctuelles. Maïs

Tournesol

Pucerons

Dans les parcelles tardives, au stade 3 paires de feuilles, intervenir après observation de 30 à 50 pucerons par plante.

Les seuils sont atteints dans quelques parcelles.

Arrêt des traitements après le stade bouton étoilé.

EKE - Publication périodique CPPAP № 2011 AD - Toute reproduction, même partielle, est soumise à notre autorisation - ISSN 0980 - 8507

Imprimerie de la DRAF - Directeur-gérant : D. VERB

Blé

Les derniers blés sont en épiaison. La septoriose reste la maladie principale, accompagnée parfois de rouille brune qui a, cependant, peu progressé, du fait des températures fraîches

Les derniers traitements doivent être effectués très rapidement. Rappelons que leur efficacité chute très vite après la floraison.

Maïs

Noctuelles

Avec les températures fraîches actuelles, les maïs se développent lentement et, de ce fait, peuvent être l'objet d'attaques de vers gris ou autres noctuelles. Ces chenilles s'attaquent à la base des plantes où elles creusent des galeries entraînant la chute rapide des jeunes maïs. Les sorties nocturnes des chenilles rendent plus difficile leur identification.

La lutte peut s'effectuer avec des pyréthrinoïdes, soit sous forme liquide, soit incorporées avec des ap-

pâts. La formulation liquide a donné de meilleurs résultats, à condition de respecter deux conditions essentielles:

- Mouiller très abondamment : apporter au minimum 500 à 600 l d'eau, 800 à 1 000 l/ha si possible.
- Traiter de préférence en fin de journée.

Se reporter au dépliant AGPM -SPV figurant dans le classeur pour les produits et quantités à apporter

Pyrale

Avec les températures fraîches, la chrysalidation des chenilles n'a pas encore débuté.

Le vol sera certainement plus tardif que l'an passé.

Colza

Sclerotinia

Les symptômes de sclérotinia apparaissent sur tiges principales.

Alternaria

Des taches sont visibles dans quelques parcelles de façon ponctuelle, mais peuvent atteindre les étages foliaires supérieurs.

Surveiller vos parcelles. Attendre pour intervenir.

P398

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DIRECTION RÉGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT



SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX 38, rue Sainte-Catherine - 54043 NANCY CEDEX - Tél.: 83.30.41.51